Motif de consultation parmi les plus fréquents en MG avec une prévalence chez les non fumeurs de 5-8%

Les motifs de consultation pour une toux sont souvent des complications : fatigue (57%), gêne de l'entourage (55%), insomnie (45%), handicap social (45%), douleur thoracique (44%), incontinence (39%)...

Toux aiguë < 3 semaines

Toux subaiguë : 3-8 semaines

Toux chronique > 8 semaines

L'évaluation repose sur l'interrogatoire, le contexte, le patient : âge, profession, traitements en cours, les antécédents personnels et familiaux, atopie, tabac, entourage

Caractéristiques de la toux : durée, nature de la toux sèche, productive (intérêt plus thérapeutique), facteurs favorisants ; décubitus, écoulement nasal, effort, environnement particulier

Saison environnement : pollution, pollens, hiver/printemps, mode de garde, crèche, institution

Symptômes associés : fièvre, rhinorrhée, éternuements, céphalées, dysphagie, conjonctivite, expectoration, hémoptysie, AEG, dyspnée, pyrosis, dyspepsie, douleurs thoraciques, douleurs abdominales etc..

Répercussions : vomissements, fracture de côte, incontinence urinaire, troubles du sommeil, arrêt de travail, conflits avec l'entourage

Examen clinique général et en particulier ORL et pneumologique

Toux aiguës

l'écoulement nasal postérieur est la principale cause.

Etiologies fréquentes	Etiologies moins fréquentes
Virose saisonnière	Asthme
Sinusite bactérienne	IVG
Coqueluche °	Pneumopathie
Poussée aiguë de BPCO	Inhalation
Rhinite allergique	Embolie pulmonaire
Irritation environnementale	Epanchement pleural

1/ Infection virale saisonnière :

Cause principale des toux aiguës

Rhinorrhée, éternuements, obstruction nasale, écoulement nasal postérieur, larmoiement avec ou sans fièvre

Examen pneumologique normal

2/ Sinusite aiguë bactérienne

Douleur maxillaire sous orbitaire majorée en se penchant en avant, plutôt unilatérale, pulsatile, prédominant le soir, la nuit

Rhinorrhée et jetage postérieur mucopurulent, sécrétions purulentes endonasales

Critères mineurs : fièvre > 3j, gêne pharyngée, éternuement, obstruction nasale > 5 jours

3/ Bronchite aiguë

toux aiguë de 5 à 10 jours

toux 'bactérienne' : toux subaiguë à chronique dite " post infectieuses ". L'antibiothérapie n'est pas justifiée sauf situations particulières ou toux et expectoration au delà de sept jours (AFSSAPS 99)

4/ toux de la coqueluche :

chez l'adulte la clinique n'est pas spécifique

Le traitement immédiat du patient protège les nourrissons contacts d'une coqueluche grave

Diagnostic par deux sérologies par Immuno-empreintes (Ac toxine Pertussique) espacées d'un mois

Toux de durée moyenne d'environ 50 jours, moins longue si vaccination antérieure

Toux chroniques

Les trois principales causes sont (dans presque 100% des cas, non fumeur, sans IEC): écoulement pharyngé postérieur, Toux allergique/ asthme, RGO

Les autres causes majeures :

Toux post-infectieuses

Toux médicamenteuses (IEC surtout)

Bronchite chronique (5% des motifs de C.)

Toux " idiopathiques " et " psychogènes "

Les causes multiples sont fréquentes : 18% à 62%

1/ Toux chronique par écoulement pharyngé postérieur (EPP) ou " Postnasal drip syndrome (PNDS) "

Fréquent et sous estimée +++ , cause la plus fréquente de toux chronique

Pas de critère clinique univoque mais fréquence de la gêne pharyngée, congestion et écoulement nasal

Test thérapeutique crucial pour confirmer ce diagnostic étiologique: anti H1 1^ogénération + décongestionnant

2/ Toux chronique allergique

Fréquente (15-50% des toux chroniques selon l'âge) - Atopie: 15% de la population

Souvent méconnue si pas d'autres symptômes , radiographie normale

Contexte atopique personnel ou familial, Toux plutôt nocturne ou le matin , EFR

Épreuve thérapeutique par test Corticoïde inhalé

3/ asthme

Oppression thoracique, wheezing, dyspnée, toux

EFR : TVO et/ou hyperréactivité bronchique

Diagnostic par épreuve thérapeutique : CSI

4/ toux chronique et RGO

Évoquer un RGO devant une toux posturale, nocturne souvent avec pyrosis , parfois irritation pharyngée en particulier matinale ; mais dans 75% des cas le RGO est silencieux

Proposer un test thérapeutique: IPP parfois à double dose + hygiène alimentaire et posturale.

Sous traitement, la toux liée au RGO disparaît dans 70%-100% des cas en 5 à 6 mois

5/ Toux médicamenteuses

Diagnostic le plus souvent facile

- IEC: prévalence 5-15% , indépendant de la dose et pas de chronologie, délai 8j à 6 mois

disparition de la toux en 1-3 semaines à l'arrêt du traitement

- SARTANS : prévalence de 1-10%

- Béta-BLOQUANTS : chercher un bronchospasme sous jacent

6/ Toux chronique et maladies cardio-respiratoires

Diagnostic: clinique, radio et bilan approprié

Surtout bronchite chronique post-tabagique, Dilatation des bronches, Cancer bronchique, Insuffisance cardiaque

7/ Toux psychogènes et "nerveuses"

toux diurne, timbre animal

Contexte anxieux, affection psychiatrique associée inconstante

Diagnostic d'élimination

Peu d'efficacité des antitussifs

TOUX CHRONIQUE CHEZ L'ENFANT

La toux peut être déclenchée par toute agression sur les voies aériennes. Elle est le plus souvent en rapport avec une infection banale mais peut aussi être le signe révélateur d'une pathologie beaucoup plus rare.

1. PRINCIPALES SITUATIONS RADIO-CLINIQUES

1.1. Première situation : toux chronique cliniquement ciblée

Il peut s'agir d'un enfant porteur d'une maladie déjà connue : mucoviscidose, déficit immunitaire dans le cadre d'un traitement antimétabolique, asthme, bronchiolite oblitérante séquellaire d'une virose sévère de la petite enfance...

Il peut s'agir aussi d'un enfant dont le contexte clinique est très évocateur, le plus souvent rhino-trachéo-bronchites.

1.2. Deuxième situation : toux cliniquement isolée mais radiologiquement ciblée

L'analyse du cliché simple oriente le diagnostic : foyer de bronchopneumopathie chronique (avec ou sans DDB) ; compression trachéo-bronchique par une tumeur médiastinale ou une malformation vasculaire ; asymétrie de transparence et/ou de volume pulmonaire pouvant correspondre à des pathologies aussi variées qu'un emphysème obstructif ou qu'un petit poumon congénital ; syndrome interstitiel dont l'étiologie restera à préciser...

La persistance d'un foyer parenchymateux ou sa répétition à chaque poussée de bronchopathie chronique doit systématiquement faire penser à un certain nombre de diagnostics : malformation broncho-pulmonaire ; anomalie des bases évoquant une séquestration, un corps étranger bronchique

1.3. Troisième situation : toux chronique inexplicée tant sur le plan de la clinique que sur le cliché simple.

2. LES INVESTIGATIONS RADIOLOGIQUES

2.1. La radiographie des sinus de la face

Au dessus de l'âge de deux ans, elle est indispensable si l'on se souvient que la sinusite est une cause très fréquente de toux chronique de l'enfant et que la relation atteinte des voies aériennes supérieures - bronchopathie, oriente sérieusement vers une maladie d'appareil ou vers une maladie générale particulièrement génétique (mucoviscidose, déficit immunitaire, allergie, maladie des cils bronchiques ...)

2.2. La radiographie du thorax en expiration

Elle doit être réalisée systématiquement devant toute bronchopathie chronique inexplicée, même si la radiographie simple en inspiration ne montre pas de modification de volume ou de transparence pulmonaire. Elle peut mettre en évidence un éventuel trappage passé inaperçu lors du cliché inspiratoire signant ainsi l'origine obstructive bronchique du processus pathologique.

2.3. Le scanner thoracique :

devant une toux apparemment isolée, recherche des processus situés dans les gouttières para vertébrales et en projection rétro-cardiaque ; analyse le médiastin, la trachée objectivant ainsi des anomalies compressives (kyste bronchogénique, arc aortique anormal...).

2.4. Le transit oeso-gastrique

Il met en évidence des anomalies quelquefois passées inaperçues : un reflux gastro oesophagien avec ou sans malposition cardio tubérositaire ; compression extrinsèque par une lésion médiastinale ; fistule oeso trachéale minime ; trouble de la déglutition ; méga-oesophage.

3. LES EXAMENS BIOLOGIQUES

- NFS-VS

- électrophorèse des protéides : déficits en albumine, alpha 1 globulines et gamma globulines prédisposant aux bronchopathies.

- dosage des immuno globulines sériques A, M, G, identifie les déficits globaux ou sélectifs en anticorps

- déficit en alpha 1 antitrypsine

- dosage des IGE sériques cherche à apprécier le facteur allergologique éventuel

- test de la sueur

ALGORITHME DECISIONNEL EN CAS DE TOUX CHRONIQUE

	Enfant	Adulte	Vieillard
Fréquentes	infection virale asthme psychogène	fumée bronchite chronique postnasal drip syndrom reflux gastro-œsophagien	fumée bronchite chronique st. après infection virale
Rares	aspiration d'un corps étranger mucoviscidose	cancer bronchique tuberculose bronchiectasies pneumonie pneumopathies interstitielles psychogènes	cancer bronchique insuffisance cardiaque asthme broncho-aspiration tuberculose pneumonie
Iatrogènes		inhibiteurs de l'ECA stéroïdes en aérosols	