



# HBP: maladie chronique et complexe



# Traitements de l'HBP

Surveillance



Traitements

Médicaux

Phytothérapie

Alphabloquants


Inhib. 5 alpha reductase

Chirurgicaux

Résection endoscopique

Adénomectomie par taille

# Phytothérapie





# PHYTOTHERAPIE

**Serenoa repens PERMIXON®**

**Pygeum africanum TADENAN®**

- **Mode d 'action imprécis**
- **Symptomatologie modérée**
- **Sans complication**



# Symptômes urinaires liés à l'HBP

**TUBA**

**Symptômes  
Obstructifs**

**Symptômes  
Irritatifs**

- Effet de masse
- Tonus musculaire



***TUBA = Prostate + Vessie (+ SNC)***

<b><i>Prostate</i></b>	<b>Contraction musculaire lisse Volume</b>	<b><math>\alpha 1A</math>  5 ARI</b>
------------------------	--	--

<b><i>Detrusor</i></b>	<b>Instabilité Symptômes Irritatifs</b>	<b><math>\alpha 1D &gt; \alpha 1A</math>  Receptors Muscariniques</b>
------------------------	---	---

<b><i>Spinal</i></b>	<b>Lombosacré</b>	<b><math>\alpha 1D &gt; \alpha 1A - \alpha 1B</math></b>
----------------------	-------------------	--

# **$\alpha$ - BLOQUANTS**

**Alfuzosine XATRAL<sup>®</sup>**

**Doxazosine ZOXAN<sup>®</sup>**

**Tamsulosine JOSIR<sup>®</sup> et OMIX<sup>®</sup>, OMEXEL<sup>®</sup> et  
MECIRE<sup>®</sup>**

**Terazosine DYSALPHA<sup>®</sup> et HYTRINE<sup>®</sup>**

- **Cible : contraction musculaire lisse de la prostate**
- **Effet rapide**
- **Attention hypotension**

# **INHIBITEUR DE LA 5 $\alpha$ REDUCTASE**

**Finasteride CHIBROPROSCAR<sup>®</sup>**

**Dutastéride AVODART<sup>®</sup>**



- **Cible : réduction du volume glandulaire**
- **« Grosses » prostates**
- **Effet retardé**
- **Attention sexualité**

# La résection endoscopique de la prostate

Vessie

Copeaux  
de Prostate

Résecteur



# Observatoire des maladies prostatiques

## Résultats bruts 2004

- 1,239,774 hommes prenant des médicaments pour HBP

9,437,140 ordonnances avec médicaments pour HBP


16,713,805 ordonnances autres qui devraient permettre de déduire la co-morbidité

- 63.398 hommes opérés pour HBP

1.670 opérés deux fois pour HBP dans l'année

33.704 prenaient un traitement médical pour HBP avant l'intervention.


Age: 72, IPSS: 15, Prostate: 55g, PSA: 3.5 ng/ml,  
Résidu post-mictionnel: 70 ml



**Traitement de première  
intention ?**

**Durée de traitement ?**

# Prise en charge de l'HBP non compliquée



*FR : âge >62 ans, IPSS > 17, volume de prostate > 30 g, PSA > 1.6 ng/ml, résidu post-mictionnel > 50 ml*

**TRT médical de  
première intention**

**Prostate < 30-40 g**

**Prostate ≥ 30-40 g**

**α bloquants ou  
Extraits de Plantes**

**α bloquants  
ou 5 ARI ou Extraits  
de Plantes**

**Evaluation Clinique à 3 mois**

**Succès : Poursuite  
du TRT 3 mois,  
long cours si F.R.**

**Echec**

# Echec du TRT médical de première intention

IPSS 7 - 17

IPSS > 17

P. < 30-40 g

P. ≥ 30-40 g

EP → αB  
Chgt. αB


EP → αB  
5ARI → αB  
αB → 5 ARI  
αB + 5 ARI

Evaluation Clinique à 3 mois


Chirurgie

# TRT médical de 2ème intention

**Succès : Poursuite  
du TRT 3 mois,  
long cours si F.R.**



Age: 72, IPSS: 15, Prostate: 55g, PSA: 3.5 ng/ml,  
Résidu post-mictionnel: 70 ml




**Traitement de première  
intention ?**


**Durée de traitement ?**

# Quand votre traitement est efficace, quelle est la durée de votre prescription ?

*Enquête internet Medexact Nov 2004 : 532 MG et 127 urologues*



**Urologues**



**Médecins généralistes**

**Pas d'accord professionnel, et pas de recommandation**